


D20



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 104 677 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
06.06.2001 Patentblatt 2001/23

(51) Int Cl.7: **A61K 47/48**

(21) Anmeldenummer: **00122132.4**

(22) Anmeldetag: **12.10.2000**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: **01.12.1999 DE 19957916**

(71) Anmelder: **Aventis Research & Technologies
GmbH & Co. KG
65926 Frankfurt am Main (DE)**

(72) Erfinder:
• **Kretzschmar, Gerhard, Dr.
65760 Eschborn (DE)**
• **Ziegler, Thomas, Prof. Dr.
50667 Köln (DE)**
• **Gerling, Sonja
51063 Köln (DE)**
• **Lang, Martin
72108 Rottenburg am Neckar (DE)**

(74) Vertreter: **Ackermann, Joachim, Dr.
Postfach 11 13 26
60048 Frankfurt am Main (DE)**

(54) **Neue Proteinkonjugate und Verfahren zu deren Herstellung**

(57) Die Erfindung betrifft neue Proteinkonjugate der Formeln (Ia-c). Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung der Proteinkonjugate durch Umsetzung von Proteinen mit drei niedermolekularen Kom-

ponenten in einem einzigen Reaktionsschritt, wobei simultan bis zu vier Reportergruppen oder Liganden in definierter Stöchiometrie und molekularem Abstand eingeführt werden, sowie Anwendungen der neuen Proteinkonjugate.

EP 1 104 677 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft neue Proteinkonjugate und Verfahren zu deren Herstellung. Die neuen Proteinkonjugate setzen sich zusammen einerseits aus einem natürlich vorkommenden, synthetisch modifizierten oder rekombinanten Protein, Enzym, Immunoglobulin, Antikörper, Rezeptorprotein oder Lectin, sowie andererseits aus gleichzeitig drei weiteren niedermolekularen Verbindungen aus der Gruppe der Amine, Carbonsäuren, Isonitrile, Aldehyde oder Ketone. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung der neuen Proteinkonjugate durch Umsetzung eines Proteins mit den drei niedermolekularen Komponenten in einem einzigen Reaktionsschritt, wobei simultan bis zu vier Reportergruppen oder Liganden in definierter Stöchiometrie und molekularem Abstand eingeführt werden, sowie Anwendungen der so erhältlichen Proteinkonjugate.

Hintergrund:

[0002] Verknüpfungsprodukte aus Proteinen und niedermolekularen Verbindungen, sogenannte Proteinkonjugate, finden vielfältige Anwendungen im Bereich der "Life Sciences". In der Medizin gehören dazu beispielsweise therapeutisch einsetzbare Proteinkonjugate z.B. aus einem Antikörper und einem Cytostatikum. In der Diagnostik und Biochemie finden Proteinkonjugate vielfältige Einsatzgebiete zur Erkennung, Markierung und Quantifizierung der Proteine selbst oder ihrer molekularen Rezeptoren, Botenstoffe und Gegenspieler. In der medizinischen Immunologie werden Proteinkonjugate insbesondere aus Kohlenhydrat- und Nucleinsäure-Antigenen zur Immunisierung (Vaccinierung) verwendet. Das Protein kann einerseits als Vehikel zur Präsentation von Antigenen und zum zielgerichteten Transport einer oder mehrerer niedermolekularer Verbindungen dienen; andererseits kann der niedermolekulare Teil der Proteinkonjugate auch zur gezielten Modifizierung der Eigenschaften der Proteine selbst herangezogen werden. Die zuletzt genannte Variante umfaßt beispielsweise die gezielte Modifizierung der physikalischen Eigenschaften des Proteins, beispielsweise der thermischen Stabilisierung oder Löslichkeitsmerkmale eines katalytisch aktiven Enzyms, katalytisch aktiven Antikörpers (Abzym), therapeutisch wirksamen Proteins bzw. Antikörpers, oder die gezielte Modifizierung der eigentlichen katalytischen Aktivität, Spezifität oder der generellen Eigenschaften zur Erkennung eines Substrates, Rezeptors oder Liganden. Die Funktion des Proteinteils der Proteinkonjugate kann also vom bloßen Vehikel (Prodrug) zum zielgerichteten Transport (Drug Targeting) oder zur Ligandenpräsentation (Vaccine) bis zur katalytischen Aktivität oder der eigentlichen molekularen Erkennung reichen. Umgekehrt reicht die Funktion des "niedermolekularen" Teils der Proteinkonjugate von der physikalischen Modifizierung oder Stabilisierung über die Markierung mit einer oder mehreren charakteristischen und analytisch quantifizierbaren Reportergruppen (Diagnostika) bis zum eigentlichen Wirkprinzip (z.B. in Prodrugs) oder multivalenten Liganden (z.B. in Vaccinen).

[0003] Die meisten physiologisch aktiven Proteine liegen bereits als Proteinkonjugate vor, insbesondere als Konjugate mit Kohlenhydraten (Glycoproteine), was die biologische Bedeutung der Kohlenhydrate als Bindungspartner mit Proteinen unterstreicht. Sie werden vorwiegend auf der Proteinoberfläche über Serin, Threonin und Asparagin gebunden und sind beispielsweise an der Zell-Erkennung beteiligt. Die artifizielle Anbindung niedermolekularer Strukturen, insbesondere auch weiterer Kohlenhydrate zu sogenannten Neoglycoproteinen, kann z.B. zur gezielten Modulierung der Zellerkennung und zum Studium der zugrunde liegenden biologischen Phänomene herangezogen werden.

[0004] Das verfügbare Methodenrepertoire zur Anknüpfung von Kohlenhydraten, Wirkstoffen, Reporter-molekülen, Farbstoffen, Antigenen, Liganden etc. an Proteine basiert im wesentlichen auf der Präsenz reaktiver Amino-, Carboxylat-, Thiol- oder Aldehydgruppen (nach Oxidation) in Proteinen. So ist bereits bekannt, daß Proteine, die freie Amino-, Carboxylat- oder Aldehydgruppen tragen, mit niedermolekularen Verbindungen, die ihrerseits freie Carboxylat- oder Aminogruppen tragen, zu Protein-Konjugaten verknüpft werden können (Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry 37, 225-281, 1980). Freie Aminogruppen von Proteinen sind insbesondere die N-Termini der Proteine und die ϵ -Aminogruppen der Lysine, die sich zumindest teilweise mit niedermolekularen Carbonsäuren über eine Amidierungsreaktion verknüpfen lassen. Freie Carboxylatgruppen von Proteinen sind insbesondere die C-Termini der Proteine und die Carboxylatgruppen der Aminosäuren Asparaginsäure und Glutaminsäure, die zumindest teilweise mit niedermolekularen Aminen über eine Amidierungsreaktion verknüpft werden. Freie Thiolgruppen werden durch Cysteine präsentiert; freie Aldehydgruppen von Proteinen sind insbesondere oxidierte Kohlenhydratbestandteile der Proteine, die sich mit Aminen über eine reduktive Aminierung verknüpfen lassen.

[0005] Als Kondensationsmittel hierzu sind zahlreiche Reagenzien verfügbar, insbesondere solche, die ganz allgemein in der Organischen Synthese für Amidierungsreaktionen eingesetzt werden können (Katalog der Firma Novabiochem, 1999, Seite 264ff), wie beispielsweise Carbodiimide, insbesondere EDC (1-Ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl]carbodiimide) Ferner werden bifunktionelle Kupplungsreagenzien mit zwei äquivalenten oder zwei orthogonalen Aktivgruppen verwendet, die entweder als Crosslinker oder zur Konjugation mit einer beliebigen weiteren Komponente (niedermolekulare Verbindung, weiteres Protein, Festphase) einsetzbar sind. Als Aktivgruppen hierfür kommen Maleinimide, Imidoester, Pyridyldisulfide, α -Halogen-carbonylverbindungen und Arylazide in Frage (Katalog der Firma Pierce, 1997, Seite 133-154).

[0006] Das Labeling von Enzymen wird z.B. in der Biochemie zur Detektion in Immunoassays (ELISAs), in der Immunohistochemie, beim Western Blotting und für DNA- oder RNA-Hybridisierungsassays benötigt. Insbesondere Peroxidase (Immunoassays, Immunoblots, Immunohistochemie), Alkalische Phosphatase (Immunoassays, Immunoblots), β -Galactosidase (Immunoassays, Immunoblots, Immunocytochemie mit Blutproben) und Glucoseoxidase (Immunohistochemie, Biosensorik) finden vielfältige biochemische, analytische und technische Anwendungen.

[0007] Ein typisches Beispiel für das bekannte Vorgehen ist die Herstellung von Konjugaten der Alkalischen Phosphatase (AP), indem das Reagenz Succinimidyl-4-[Nmaleimidomethyl]-cyclohexan]-1-carboxylat (SMCC) mit freien Aminogruppen der AP in einer wäßrigen Pufferlösung zur aktivierten AP umgesetzt wird. Im zweiten Schritt kann dann eine niedermolekulare Verbindung oder ein Protein, z.B. ein Antikörper, über freie Thiolgruppen an das Maleinimid der aktivierten AP verknüpft werden. Ganz analog läßt sich z.B. auch die Meerrettich-Peroxidase (HRP) an Liganden oder an Antikörper binden.

[0008] Weitere bekannte Methoden zur Herstellung von Proteinkonjugaten sind die reduktive Aminierung z.B. mit komplexen Borhydriden oder die Umsetzung mit reaktiven, kumulierten Mehrfachbindungssystemen. Zu letzteren zählen beispielsweise die Isocyanate. So werden sogenannte Neoglycoproteine beispielsweise mit BSA (Bovine Serum Albumin) hergestellt, indem bis zu 200 Äquivalente eines Isocyanat-modifizierten sialyl-Lewis-X Tetrasaccharids mit dem Protein umgesetzt werden, wobei eine Epitopendichte bis zu 16 erreicht wird (J. K. Welply, Glycobiology 4, 259-265, 1994). Weitere bekannte Methoden zur Anknüpfung von Proteinen insbesondere an feste Phasen, wie Polysaccharide, werden in US 5,059,654 beschrieben. Typische Verfahren zur kovalenten Anknüpfung von Polysacchariden an Trägerproteine mit dem Ziel der Herstellung von Vaccinen beruhen auf analogen Verfahren insbesondere unter Einsatz bifunktionaler Linker (WO 99/18121). Die für Glycoproteine und Proteoglycane geläufigen Verfahren der Modifizierung werden in folgender Referenz ausführlich beschrieben: B.Kuberan et al., Glycoconjugate J., 16, 271-281 (1999).

[0009] Die angeführten bekannten Methoden zur Herstellung von Proteinkonjugaten verwenden zumeist sehr reaktive, elektrophile Reagenzien (z.B. Isocyanate, Carbodiimide), die mit den nativen, nucleophilen Gruppen des Proteins (Amin, Carboxylat, Thiol) reagieren. Für die Anbindung eines nucleophilen Antigens an ein Protein, beispielsweise zur Produktion synthetischer Vaccine, wird dessen Reaktivität durch ein geeignetes bifunktionelles Reagenz quasi "umgepolt", indem das nach reduktiver Aminierung des Oligosaccharid-Antigens gewonnene Nucleophil z.B. mit einem Succinimid-Aktivester amidiert wird, der seinerseits über einen Linker mit einem elektrophilen Maleinimid verknüpft ist, welches nachfolgend über die nucleophilen Thiolgruppen des Proteins reagiert. Mit den bekannten Kupplungsreagenzien lassen sich im Prinzip auch mehrere Reportergruppen oder Liganden an das Protein hängen, sofern letztere als Mischung oder nacheinander in mehreren Verfahrensschritten umgesetzt werden. Allerdings wäre die Stöchiometrie der auf diese Weise herzustellenden Proteinkonjugate nicht kontrollierbar, da nicht alle funktionellen Gruppen des Proteins genau gleichermaßen reaktiv sind. Auch die molekulare Nähe einzuführender Liganden oder Reportergruppen im Protein wäre so keinesfalls kontrollierbar.

[0010] Andererseits wären neue Proteinkonjugate wünschenswert, in denen bis zu vier weitere funktionelle Gruppen (z.B. Liganden, Antigene) oder analytisch detektierbare Gruppen (Reportergruppen, z.B. Farbstoffe) vorliegen können. Diese Gruppen sollten alle gleichzeitig in einem einzigen einfachen Verfahrensschritt an das Protein geknüpft werden, mit exakt definierter Stöchiometrie des gebildeten Proteinkonjugates und mit strukturell definierter molekularer Distanz der funktionellen bzw. analytischen Gruppen.


[0011] Dabei können die neuen Proteine Ia-c auch als Mischungen vorliegen mit dem Ziel, aus einer zunächst vorhandenen Proteinmischung, die z.B. aus einer Zelle oder Körperflüssigkeit gewonnen wurde, nach deren Auftrennung z.B. mittels Hochdruckflüssigkeitschromatographie (HPLC) oder zweidimensionaler Gel- oder Kapillarelektrophorese ein spezifisches, detektierbares Proteinmuster zu erzeugen, das sich vom Muster der vorhandenen Proteinmischung durch die vorgenommene Modifizierung signifikant unterscheidet.

[0012] Die oben genannten Methoden zur Herstellung von Proteinkonjugaten mit bifunktionalen Reagenzien können diese technischen Anforderungen nicht erfüllen. Entsprechendes gilt auch für spezielle höherwertige Reagenztypen: So ist z.B. das Sulfo-SBED (Pierce, 1997, Seite 151) ein trifunktionelles Molekül zur Herstellung von Proteinkonjugaten, das einen aminospezifischen Succinimidester, einen BiotinLiganden und eine unspezifische photoreaktive Gruppe (Phenylazido) in einem Reagenz vereinigt.


Aus Endeavour 18, 115 - 122 (1994) ist weiterhin bereits bekannt, daß niedermolekulare Amine mit Carbonsäuren, Isonitrilen und einer Carbonylverbindung zu niedermolekularen Peptiden reagieren (Ugi-Reaktion). Lösliche Proteine wurden hierfür als Amino-, Carbonsäure- oder Aldehydkomponente bisher nicht verwendet. Insbesondere wurden Isonitrile als Kondensationsmittel in Verbindung mit Carbonylverbindungen hierfür bisher nicht verwendet.

Beschreibung:


[0013] Die Erfindung betrifft neue Proteinkonjugate der in den Formeln (Ia-c) angegebenen Strukturen



(Ia)



(Ib)



(Ic)

in denen **P** ein freie Amino-, Carboxyl- oder Aldehydgruppen tragendes Protein wie ein Albumin, Immunglobulin, Antikörper, Avidin, Streptavidin, Hemocyanin, Lectin, Enzym oder Serum-Glycoprotein bedeutet,

und R_A für einen von Aminen $\text{R}_\text{A}-\text{NH}_2$ abgeleiteten Rest steht, wobei R_A ein Aminogruppen tragender linearer oder verzweigter Alkyl- oder Cycloalkylrest aus bis zu 18 C-Atomen, ein Aminogruppen tragendes Alkaloid, Peptid oder Protein, Kohlenhydrat, Nucleotid, Nucleosid, Steroid, Terpen, Porphyrin, Chlorin, Corrin, Eicosanoid, Pheromon, Vitamin, insbesondere ein n-(Biotinamido)-n-alkylrest mit $n = 2-8$, ein Antibiotikum, Cytostatikum, ein Farbstoffmolekül oder einen Kryptanden, insbesondere Trisbipyridinium-europium(III), bedeuten,

und R_C für einen von Carbonsäuren $\text{R}_\text{C}-\text{CO}_2\text{H}$ abgeleiteten Rest steht, wobei R_C ein Carboxylgruppen tragender linearer oder verzweigter Alkyl- oder Cycloalkylrest aus bis zu 18 C-Atomen, ein Carboxylgruppen tragendes Alkaloid, Peptid oder Protein, Kohlenhydrat, Nucleotid, Nucleosid, Steroid, Terpen, Porphyrin, Chlorin, Corrin, Eicosanoid, Pheromon, Vitamin, insbesondere Biotin, ein Antibiotikum, Cytostatikum, Farbstoffmolekül oder einen Kryptanden, insbesondere Trisbipyridinium-europium(III), bedeuten,

und R_I für einen von Isonitrilen $\text{R}_\text{I}-\text{NC}$ abgeleiteten Rest steht, wobei R_I ein Isonitrilgruppen tragender linearer oder verzweigter Alkyl- oder Cycloalkylrest aus bis zu 18 C-Atomen, Methoxycarbonylethyl, t-Butoxycarbonylmethyl, Phenyl, o-Alkylphenyl, m-Alkylphenyl, p-Alkylphenyl, o-Halogenphenyl, m-Halogenphenyl, p-Halogenphenyl, 2,3-Dihalogenphenyl, 2,4-Dihalogenphenyl, 3,4-Dihalogenphenyl, o-Alkoxyphenyl, m-Alkoxyphenyl, p-Alkoxyphenyl, m-Arylphenyl, p-Arylphenyl, o-Aryloxyphenyl, m-Aryloxyphenyl, p-Aryloxyphenyl, o-Nitrophenyl, m-Nitrophenyl, p-Nitrophenyl, 1-Naphthyl, 2-Naphthyl, Benzolsulfonylmethyl, p-Toluolsulfonylmethyl, ein Pyranosyl-, Furanosyl- oder Nucleosyl-Rest, einen n-(Biotinamido)-n-alkylrest mit $n = 2-8$ oder ein Farbstoffmolekül bedeuten,

und R_1 und R_2 für einen von Carbonylverbindungen abgeleiteten Rest $\text{R}_1-\text{C}(=\text{O})-\text{R}_2$ stehen und gleichzeitig oder unabhängig voneinander Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl, Cyclopropyl, Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Cyclobutyl, Pentyl, Cyclopentyl, Hexyl, Cyclohexyl, 2-Methylbutyl, Heptyl, Octyl, Nonyl, Decyl, Undecyl, Dodecyl, Methoxycarbonylethyl, t-Butoxycarbonylmethyl, Phenyl, o-Alkylphenyl, m-Alkylphenyl, p-Alkylphenyl, o-Halogenphenyl, m-Halogenphenyl, p-Halogenphenyl, 2,3-Dihalogenphenyl, 2,4-Dihalogenphenyl, 3,4-Dihalogenphenyl, o-Alkoxyphenyl, m-Alkoxyphenyl, p-Alkoxyphenyl, o-Arylphenyl, m-Arylphenyl, p-Arylphenyl, o-Aryloxyphenyl, m-Aryloxyphenyl, p-Aryloxyphenyl, o-Nitrophenyl, m-Nitrophenyl, p-Nitrophenyl, 1-Naphthyl, 2-Naphthyl, Oxiranyl, Vinyl, Propenyl, Propen-2-yl, 2-Penten-2-yl, 3-Hepten-3-yl, Penta-1,3-dienyl, Phenylmethyl, 1-Phenylethyl, 2-Phenylethyl, Cyclohexen-3-yl, Cyclohexen-4-yl, 2-Furyl, 3-Furyl, 2-Thienyl, 3-Thienyl, 2-Pyrrolyl, 3-Pyrrolyl, Halogenmethyl, Dihalogenmethyl, Trihalogenmethyl, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl bedeuten können

und $n = 1-15$, vorzugsweise 1-10 bedeutet.

[0014] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung der neuen Proteinkonjugate der Formeln (Ia-c), indem man ein lösliches Protein (**P**) oder ein an einer festen Phase immobilisiertes Protein (**P**), das freie Amino-, Carbonsäure- oder Aldehyd-Gruppen trägt, mit einem Amin $\text{R}_\text{A}-\text{NH}_2$ oder einer Carbonsäure $\text{R}_\text{C}-\text{CO}_2\text{H}$, einem Isonitril $\text{R}_\text{I}-\text{NC}$ und einer Carbonylverbindung $\text{R}_1-\text{C}(=\text{O})-\text{R}_2$, wobei die Reste R_A , R_C , R_I , R_1 und R_2 die oben angegebene Bedeutung haben, in wässriger Lösung zu den betreffenden Protein-Konjugaten (Ia), (Ib) oder (Ic) umsetzt.

[0015] Dabei werden die betreffenden Strukturvarianten (Ia-c) - wie aus den Strukturformeln ersichtlich - aus den entsprechenden Komponenten wie folgt erhalten:

(Ia): aus dem Protein (**P**), dem Amin $\text{R}_\text{A}-\text{NH}_2$, dem Isonitril $\text{R}_\text{I}-\text{NC}$ und der Carbonylverbindung $\text{R}_1-\text{C}(=\text{O})-\text{R}_2$,

(Ib): aus dem Protein (**P**), der Carbonsäure $\text{R}_\text{C}-\text{CO}_2\text{H}$, dem Isonitril $\text{R}_\text{I}-\text{NC}$ und der Carbonylverbindung $\text{R}_1-\text{C}(=\text{O})-$

R₂,(Ic): aus dem oxidierten Protein (P), der Carbonsäure R_C-CO₂H, dem Amin R_A-NH₂ und dem Isonitril R_I-NC.

5 [0016] Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders geeignet für die Umsetzung von Proteinen (P), die freie Aminogruppen oder freie Carboxylatgruppen oder freie Aldehydgruppen tragen. Insbesondere geeignet sind die folgenden Proteine entweder in freier oder festphasengebundener Form:

- Trägerproteine, die mit Haptene (Peptiden oder Kohlenhydrate) als immunogene Epitope verknüpft werden sollen, z.B. KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin), CRM (nicht toxische Diphtherie-Toxinvarianten) oder Albumine wie Rinderserum-Albumin (BSA: Bovine Serum Albumin).
- In der Immunologie verwendete native oder rekombinante Proteine mikrobiellen Ursprungs, z.B. die Proteine A, G oder A/G, die den Fc-Teil von Immunglobulinen, z.B. in IgG, erkennen. Ferner Avidin und Streptavidin sowie Lectine wie z.B. Concanavalin A oder Weizenkeim-Agglutinin (WGA) und Peptidoglycane
- Immunglobuline IgG, IgM, IgA, auch in oxidierten Form, z.B. oxidiertes IgG.
- Enzyme, wie z.B. Pepsin, Papain, Trypsin, Ficin, Chymotrypsin, Lipasen, Esterasen, Oxidoreduktasen, Transaminasen, Glycosidasen, z.B. β -Galactosidase, Glycosyltransferasen, Amidasen, Hydantoinasen, Meerrettich-Peroxidase (HRP: Horse Radish Peroxidase, Alkalische Phosphatase (AP)).

20 [0017] Die Umsetzung des Proteins (P) mit dem Amin R_A-NH₂ oder der Carbonsäure R_C-CO₂H, und dem Isonitril R_I-NC und der Carbonylverbindung R₁-C(=O)-R₂ erfolgt beim erfindungsgemäßen Verfahren derart, daß zu einer Lösung oder einer Suspension von (P) in wäßrigem Puffer, der die weiteren Komponenten jeweils in mindestens molarer Menge zum Protein enthält, nacheinander das Amin R_A-NH₂ oder die Carbonsäure R_C-CO₂H und das Isonitril R_I-NC hinzu gegeben werden. Hierbei werden die jeweils benötigten Komponenten Amin R_A-NH₂, Carbonsäure R_C-CO₂H, Isonitril R_I-NC und die Carbonylverbindung R₁-C(=O)-R₂ in einem 10-10.000 fachen molaren Überschuß zum Protein (P) eingesetzt, vorzugsweise im molaren Verhältnis 100-1.000, besonders bevorzugt im Verhältnis 200-1000.

25 [0018] Als Reaktionslösung eignen sich wäßrige Puffer wie beispielsweise 0.001 - 1.0 molare Lösungen von Natrium- oder Kalium-dihydrogenphosphat mit Dinatrium- oder Dikalium-hydrogenphosphat oder-Tris(hydroxymethyl)-aminomethan mit Salzsäure, bevorzugt geeignet sind Pufferlösungen für den pH-Bereich zwischen 5 und 9, besonders bevorzugt zwischen pH 6 und pH 8.

30 [0019] Dem Puffer können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Cosolventien Methanol, Ethanol, Propanol, i-Propanol, Butanol, Essigsäure-ethylester, Essigsäuremethylester, Dimethylformamid, Acetonitril, Dimethylsulfoxid oder Sulfolan in Mengen von 0.1-20 Vol-% zugesetzt werden, je nach den Löslichkeitserfordernissen der Reaktionspartner. Die Reaktionstemperatur liegt zwischen 0°C und 90°C, bevorzugt bei 10°C bis 40°C, besonders bevorzugt bei Raumtemperatur.

35 [0020] Die durch das erfindungsgemäße Verfahren erhältlichen rohen Proteinkonjugate (Ia-c) können weiterhin durch Dialyse mit wäßrigen Pufferlösungen oder reinem Wasser sowie durch dem Fachmann geläufige biochemische Chromatographie-Verfahren gereinigt und dann der weiteren Anwendung zugeführt werden.

40 [0021] Der exakte Strukturachweis der Produkte (Ia-c), das heißt die analytische Bestimmung der mittleren Anzahl (n) der am Protein (P) gebundenen Komponenten, erfolgt durch die direkte Messung des Molekulargewichtes mittels MALDI-TOF-Massenspektrometrie oder durch die selektive Bestimmung einer oder mehrerer an das Protein gebundener Komponenten. So läßt sich die beispielsweise die Menge eines über die Komponenten R_A-NH₂, R_C-CO₂H oder R_I-NC eingeführten Farbstoffmoleküls in einfacher Weise über die UV-Extinktion messen. Ein analog eingeführtes Nucleotid läßt sich - gegebenenfalls nach Amplifikation mittels der PCR-Verfahren - nach den geläufigen biochemischen Verfahren quantifizieren.


45 [0022] Die resultierende berechnete Zahl (n) beschreibt die Stöchiometrie, d.h die sogenannte mittlere Epitopdichte am Protein (P) der Formeln (Ia-c).

[0023] So kann die praktische Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens beispielsweise so erfolgen, daß zuerst ein Protein (P), wie z.B. das Rinderserumalbumin, bei Raumtemperatur (ca. 20°C) in 0.1 molarem Phosphatpuffer (pH-Wert 7.5), der die Carbonylverbindung R₁-C(=O)-R₂ im molaren Verhältnis zwischen 100 - 4.000 enthält, gelöst wird. Anschließend wird zu dieser Lösung nacheinander R_A-NH₂ oder R_C-CO₂H sowie R_I-NC im entsprechenden molaren Verhältnis zwischen 100 - 4.000 (bezogen auf P) gegeben. Nach zwei Tagen Reaktionszeit bei Raumtemperatur werden die Überschüsse der niedermolekularen Reaktionskomponenten durch Dialyse mit Puffer oder reinem Wasser oder durch Chromatographie entfernt. Die Lösung oder Suspension des so erhältlichen neuen Proteinkonjugates wird dann wie oben beschrieben analytisch charakterisiert.


55 [0024] Durch Variation der insgesamt 4 Reaktionskomponenten 1. Amin R_A-NH₂, 2. Carbonylverbindung R₁-C(=O)-R₂, 3. Carbonsäure R_C-CO₂H und 4. Isonitril R_I-NC - wobei das Protein (P) je nach Auswahl der verbleibenden 3 im Überschuß eingesetzten Reaktionskomponenten entweder als Amin R_A-NH₂, Carbonylverbindung R₁-C(=O)-R₂ oder

als Carbonsäure $R_C\text{-CO}_2\text{H}$ eingesetzt wird - ergeben sich mannigfaltige Möglichkeiten der Anbindung nahezu beliebiger Komponenten an (P), wobei über Variation der betreffenden Reste R bis zu 4 verschiedene Typen von Liganden (z.B. Biotin) und/oder Reportergruppen (z.B. Farbstoffe) in exakt definiertem stöchiometrischem Verhältnis 1:1:1:1 und in definiertem molekularem Abstand relativ zueinander und relativ zum Protein eingeführt werden. Die molekularen Verhältnisse lassen sich hierbei noch durch die Auswahl der Spacerlängen in den Resten R_A , R_1 , R_2 , R_C und R_I einstellen.

[0025] Eine kleine Auswahl der sich daraus ergebenden vielfältigen Möglichkeiten beispielsweise zur Konjugation von 2 verschiedenen Farbstoffen (F1 und F2) sowie eines weiteren beliebigen Liganden, z. B. von Biotin (B) wird durch folgende Formeln illustriert:



[0026] Ein Beispiel ist z.B. die Verwendung eines Farbstofflabels als Carboxylkomponente $R_C\text{-CO}_2\text{H}$ und eines Biotinliganden als Aminkomponente $R_A\text{-NH}_2$:



[0027] Diese Beispiel illustriert das Anwendungspotential der erfindungsgemäßen Proteinkonjugate und die Einfachheit des Verfahrens ihrer Herstellung: Die vier Reaktionskomponenten

1. Oxidierte Protein Meerrettichperoxidase als Carbonylkomponente HC(=O)-R_2 ,
2. Rhodamin Farbstofflabel als Carboxylkomponente $R_C\text{-CO}_2\text{H}$
3. Biotinliganden als Aminkomponente $R_A\text{-NH}_2$

4. Cyclohexylisonitril als R_1 -NC

werden einfach im gewünschten stöchiometrischen Verhältnis vereinigt und unter milden Bedingungen im wäßrigen Puffer umgesetzt. Der skizzierte Reaktionsverlauf und die Struktur des neuen Proteinkonjugates läßt sich nun exakt anhand unabhängiger funktionaler Bestimmungsverfahren für die beiden Reportergruppen (Biotin, Farbstoff) charakterisieren: So ergibt die Molmassenbestimmung mittels MALDI-TOF eine mittlere Epitopendichte $n = 3.4$, die durch einen Biotin-ELISA-Test ($n = 3.3$) und die UV-Extinktionsmessung ($n = 3.5$) abgesichert wird. Die Aktivität des Enzyms (Restaktivität 93%) bleibt im Enzymassay weitgehend erhalten.

[0028] Umgekehrt könnte auch Rhodamin B über einen geeigneten Linker als Aminkomponente R_A -NH₂ und Biotin als Carboxylkomponente R_C -CO₂H eingesetzt werden, um nur eine der vielfältig möglichen Variationen aufzuführen. Die stöchiometrisch vorliegende Reportergruppe kann also zur direkten internen Bestimmung einer weiteren Reportergruppe herangezogen werden, und umgekehrt, was die Genauigkeit der Bestimmungen erhöht. So kann im oben aufgeführten Beispiel der Farbstoff zur direkten internen Bestimmung des Biotinylierungsgrades dienen, und umgekehrt. Dies kann wesentlich einfacher sein als die geläufigen Verfahren zur Biotinbestimmung in Proteinen, bei denen indirekte Methoden eingesetzt werden: So verwendet z.B. die HABA-Avidin-Methode (HABA = 2-Hydroxyazobenzol-4'-carbonsäure) die Bindung an Avidin unter Bildung eines farbigen Komplexes (Absorption 500 nm), der durch freies Biotin verdrängt wird. Aus mehreren Meßpunkten wird eine Standardkurve erstellt, aus der Biotinylierungsgrad bestimmt wird.

[0029] Die erfindungsgemäßen Proteinkonjugate (Ia-c) lassen sich also vielfältig beispielsweise auch mit dem System des Biotin-Avidin-Komplexes (ABC) zur Detektion und Quantifizierung von Antigenen, z.B. an festen Phasen, verwenden. Dazu gehören naturgemäß auch sämtliche auf diesem System beruhende biochemische Assaymethoden, wie z.B. der klassische ELISA-Assay, Fluoreszenzaktivierte Zellsortierung (FACS), Affinitätschromatographie und das Western Blotting. Avidin, Streptavidin, Meerrettichperoxidase, Glucoseoxidase und Alkalische Phosphatase sind häufig verwendete Proteine und Enzyme in diesen Systemen. Häufig verwendete Farbstoffe sind z.B. Fluorescein, (FITC), Rhodamin B und Texasrot, aber auch Varianten dieser Moleküle mit verbesserten Fluoreszenzeigenschaften können im Sinne des erfindungsgemäßen Verfahrens verwendet werden, beispielsweise Konjugate von Sulforhodaminen (US 5,846,737).

[0030] Die erfindungsgemäßen Proteinkonjugate (Ia-c) lassen sich demnach vielfältig in die immunologischen Methoden der klinischen Diagnostik integrieren, mit deren Hilfe beispielsweise Plasmaspiegel von Analyten im Blut kontrolliert werden, hormonelle Regelkreise überwacht werden (Schilddrüsenfunktion, Fertilität), virale Infektionen nachgewiesen werden (Hepatitis, HIV) oder Tumor-assoziierte Proteine detektiert werden (Tumornachsorge). Makromoleküle wie Peptide, Proteine und Nucleinsäuren werden in der Regel über heterogene Immunoassays (Festphase z.B. als Träger eines Antikörpers) bestimmt, während für niedermolekulare Substanzen auch homogene Methoden wie der Fluoreszenz-Polarisationsassay (FPIA) oder Enzymmultiplied Immunoassay (EMIT) verwendet werden. Neuere Methoden haben eine gesteigerte Sensitivität, indem der Analyt (z.B. ein Tumormarkerprotein) gleichzeitig an einen monoklonalen Antikörper, konjugiert mit einem Europium(III)-Komplex, und an einen weiteren Antikörper, gekoppelt an ein Farbstoffmolekül (Allophycocyanin) bindet. Nach der Theorie von Förster führt die eingestrahlte monochromatische Lichtenergie bei der Bindung durch die molekulare räumliche Nähe von Lanthanidkomplex und Farbstoffmolekül zu einem strahlungslosen Übergang von ersterem auf letzteres, und dadurch wird eine langlebige und amplifizierte Emission hervorgerufen (Time-resolved Amplified Cryptate Emission Assay, TRACE) (Bioforum, 1-2, 1998, 14-16). In ähnlicher Weise kann die räumliche Nähe von einem oder mehreren Farbstoffen (multiple chromophore Donorgruppen) mit einem Fluoreszenz-Akzeptorfarbstoff zur Signalamplifikation genutzt werden (US 5,849,489). Eine besonders empfindliche Spurenanalyse von Biomolekülen beruht auf der sogenannten Fluoreszenz-Cross-Correlation (FCS) -Spektroskopie, bei der die Lichtverstärkung durch zwei fluorogene Farbstoffe in definierter räumlicher Nähe erfolgt. Die Einstrahlung mit zwei entsprechenden Laserquellen führt zu Energietransfers und einer verstärkten Fluoreszenz-Emission des markierten Moleküls, die mit Photonen-Detektoren in konfokaler Anordnung gemessen wird. Verwendet werden z.B. die Farbstoffe Rhodamin-Grün und Cy5 (beide von Amersham Life Sciences erhältlich). Die Grundlagen dieser Methodik, mit deren Hilfe wenige Kopien einer amplifizierten DNA quantifiziert wurden, finden sich beschrieben in: R. Rigler et al., J. Biotechnol., 63, 97-109 (1998).

[0031] Da das erfindungsgemäße Verfahren die Anknüpfung von bis zu 4 Reportgruppen in definierter Stöchiometrie und einstellbarer molekularer Distanz erlaubt, lassen entsprechende Proteinkonjugate (Ia-c) mit diesen Farbstofftypen (Beispiele für entsprechende Derivate in US 5,849,489) ebenfalls eine stark gesteigerte Empfindlichkeit der Detektion des Proteins selbst bzw. eines gebundenen Liganden bzw. eines im Immunoassay bestimmten zu bestimmenden Analyten erwarten.

[0032] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich insbesondere auch zur gezielten Konjugation von Sacchariden mit definierter Epitopdichte am Protein (siehe Beispiele). Letztere kann z.B. über die stöchiometrische, simultane Anbindung eines Farbstoff-Reportermoleküls in einer der Reaktionskomponenten bestimmt werden. Dies eröffnet die Möglichkeit zur kontrollierten Anbindung von mehreren Saccharid-Antigenen, beispielsweise von verschiedenen bak-

teriellen oder viralen Serotypen (z.B. Influenza, Hepatitis) zu noch höhervalenten Vaccinen oder von mehreren Tumor-assoziierten Antigenen für Tumervaccine, beispielsweise an hierfür geeignete Proteine wie CRM (nicht-toxische Diph-terietoxin-Variante) oder an das KLH-Protein

[0033] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich ferner zur kovalenten Anknüpfung von einem oder von bis zu drei verschiedenen Cytostatika an ein Protein, beispielsweise an einen Tumor-spezifischen Antikörper oder an ein Enzym, z.B. an eine Glycosidase, oder an ein Glycoprotein, das von einem zellspezifischen Lectin erkannt wird, wie z.B. an Asialoglycoproteine, die von Leberzellen-Lectinen erkannt werden.

[0034] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich ferner zur Umsetzung von Proteinmischungen mit dem Ziel, ein spezifisch detektierbares Proteinmuster nach entsprechender Auftrennung dieser Proteinmischung zwecks analytischer Charakterisierung des Proteoms eines Organismus (Proteomics). Hierbei wird die Probenvorbereitung lediglich um den erfindungsgemäßen Verfahrensschritt ergänzt, bevor das übliche zweidimensionale Elektrophorese-Chromatogramm (das sogenannte 2 DE map) angefertigt wird. Übliche Methoden zur Visualisierung der Proteinspots auf Gelen als stationärer Phase arbeiten mit Chromassie Blue oder Silbernitrat (Staining) sowie mit Fluoreszenzfarbstoffen. Die Auftrennung in zwei Dimensionen erfolgt nach den Molmassen und nach den isoelektrischen Punkten (pI-Werte) der Proteine, wobei basische Proteine z.B. bis pI 9 und saure Proteine bis pI 4-5 detektiert werden.


[0035] Jenseits dieser pI-Werte liegende Proteine werden schlechter oder gar nicht getrennt bzw. detektiert. Hier bietet das erfindungsgemäße Verfahren eine technische Lösung zur besseren Auftrennung und Detektion, indem stark basische Proteine als Aminkomponente mit einer niedermolekularen Carbonsäure $R_C\text{-CO}_2\text{H}$, einem Isonitril $R_1\text{-NC}$ und einer Carbonylverbindung $R_1\text{-C(=O)-R}_2$ umgesetzt werden, wobei mindestens eine der letzteren drei Komponenten z.B. jeweils Farbstoffe oder Biotinlabel enthalten. Stark saure Proteine werden sinngemäß als Carboxylkomponente mit dem Amin $R_A\text{-NH}_2$ und dem Isonitril $R_1\text{-NC}$ und der Carbonylverbindung $R_1\text{-C(=O)-R}_2$ umgesetzt. Glycoproteine werden in der oxidierten Form als Carbonylkomponente mit dem Amin $R_A\text{-NH}_2$, der Carbonsäure $R_C\text{-CO}_2\text{H}$ und dem Isonitril $R_1\text{-NC}$ umgesetzt. Es ergeben sich also drei neue Möglichkeiten der Mustererzeugung von Proteinmischungen, wobei die neu entstandene Gruppierungen von Proteinen durch das anhängende Label identifiziert werden können. Bei konsekutiver Anwendung aller Modifizierungen könnten entsprechende Gruppen von Proteinen gleichzeitig anhand ihrer unterschiedlichen Label zugeordnet werden.

[0036] Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Ausführungsbeispiele näher erläutert.

Beispiel 1

Herstellung von (Ia) für $P = \text{Rinderserumalbumin (BSA)}$, $R_1, R_2 = \text{CH}_3$, $R_1 = \text{Cyclohexyl}$, $R_A = 5\text{-(}\beta\text{-D-Glucopyranosyloxy)}$ pentyl, $n = 7.7$.

[0037] Zu 3 ml 0.1-molarem Phosphatpuffer, pH 7.5, gibt man bei Raumtemperatur eine Lösung von Rinderserumalbumin (1 mg, 0.015 μmol) in Wasser (1 ml), 5-%ige Acetonlösung in Wasser (67.2 μl , 45 μmol), 5-Aminopentyl- $\beta\text{-D-glucopyranosid}$ (13.59 mg, 45 μmol) und 2 Tropfen Cyclohexylisonitril. Die Lösung wird 2 Tage bei Raumtemperatur stehen gelassen und mit einer Ultrafiltrationszelle konzentriert. Das rohe Proteinkonjugat wird anschließend einmal gegen 0.1 molaren Phosphatpuffer, pH 7.5, und zweimal gegen reines Wasser dialysiert. Die Molmasse Produktes wird mittels MALDI-TOF-Massenspektrometrie bestimmt: Molekulargewicht: 69978 Da, d.h. eine mittlere Epitopendichte von $n=7.7$.



Beispiel 2


Herstellung von (Ia) für P = Rinderserumalbumin (BSA), $R_1, R_2 = \text{CH}_3$, $R_I = \text{Cyclohexyl}$, $R_A = 5\text{-(}\beta\text{-D-Glucopyranosyloxy)}$ pentyl, $n = 1.0$.

[0038] Analog Beispiel 1 werden in 0,1-molarem Trispuffer, pH 7.5, Rinderserumalbumin (1 mg, 0.015 μmol), 5-%ige Acetonlösung in Wasser (2.24 μl , 1.5 μmol), 5-Aminopentyl- β -D-glucopyranosid (0.45 mg, 1.5 μmol) und 1 Tropfen Cyclohexylisocyanid umgesetzt. Ergebnis: Molekulargewicht: 66898 Da, mittlere Epitopendichte: $n=1.0$; Formel siehe Beispiel 1.

Beispiel 3

Herstellung von (Ia) für P = Rinderserumalbumin (BSA), $R_1, R_2 = \text{CH}_3$, $R_I = \text{Methoxycarbonylmethyl}$, $R_A = 5\text{-(}\beta\text{-D-Glucopyranosyloxy)}$ pentyl, $n = 8.8$.


[0039] Analog Beispiel 1 werden in 0.1-molarem Phosphatpuffer, pH 7.5, Rinderserumalbumin (1 mg, 0.015 μmol), 5-%ige Acetonlösung in Wasser (22.4 μl , 15 μmol), 5-Aminopentyl- β -D-glucopyranosid (4.5 mg, 15 μmol) und 1 Tropfen Isocyanessigsäure-methylester umgesetzt. Ergebnis: Molekulargewicht: 67948 Da, d.h. mittlere Epitopendichte: $n=3.4$



Beispiel 4

Herstellung von (Ia) für P = Rinderserumalbumin (BSA), $R_1, R_2 = \text{CH}_3$, $R_I = \text{Cyclohexyl}$, $R_A = 5\text{-(2-Acetamido-2-desoxy-}\beta\text{-D-glucopyranosyloxy)}$ pentyl, $n = 8.8$.


[0040] Analog Beispiel 1 werden in 0.1-molarem Phosphatpuffer, pH 7.5, Rinderserumalbumin (1 mg, 0.015 μmol), 5-%ige Acetonlösung in Wasser (44.8 μl , 30 μmol), 5-Aminopentyl-2-acetamido-2-desoxy- β -D-glucopyranosid (10.28 mg, 30 μmol) und 2 Tropfen Cyclohexylisocyanid umgesetzt. Ergebnis: Molekulargewicht: 70480 Da, d.h. mittlere Epitopendichte: $n=8.8$.



Beispiel 5

Herstellung von (Ib) für P = Rinderserumalbumin (BSA), R₁, R₂ = CH₃, R₁ = Cyclohexyl, R_C = (2-O-Acetyl-β-D-glucopyranosyloxy)methyl, n = 9.9.

[0041] Analog Beispiel 1 werden in 0.1-molarem Phosphatpuffer, pH 7.5, Rinderserumalbumin (1 mg, 0.015 µmol), 5-%ige Acetonlösung in Wasser (89.6 µl, 60 µmol), Carboxymethyl-2-O-acetyl-β-D-glucopyranosid (19.1 mg, 60 µmol) und 2 Tropfen Cyclohexylisonitril umgesetzt. Molekulargewicht: 70975 Da, mittlere Epitopendichte: n=9.9




Beispiel 6

Herstellung von (Ib) für P = Rinderserumalbumin (BSA), R₁, R₂ = CH₃, R_I = Cyclohexyl, R_C = Rhodamin B, n = 4.1-4.8.

[0042] Analog Beispiel 1 werden in 0.1-molarem Phosphatpuffer, pH 7.0, (3932,8 µl), Rinderserumalbumin (1 mg, 0.015 µmol), 5-%ige Acetonlösung in Wasser (67.2 µl, 45 µmol), Rhodamin B (21.6 mg, 45 µmol, in 400 µl Wasser) und 2 Tropfen Cyclohexylisonitril umgesetzt. Die Bestimmung der Konjugatausbeute und der mittleren Epitopdichte erfolgt photometrisch durch Messung der Extinktionen bei 280 nm (Rinderserumalbumin) und 575 nm (Rhodamin B).

Ergebnis nach 1 Tag Reaktionszeit:	
Rinderserumalbumin: 7.4 nmol Konjugatausbeute: 49%	Rhodamin B: 30.4 nmol mittlere Epitopdichte: n=4.1
Ergebnis nach 2 Tagen Reaktionszeit:	
Rinderserumalbumin: 1,2 nmol Konjugatausbeute: 8.3%	Rhodamin B: 6,0 nmol mittlere Epitopdichte: n=4.8




Beispiel 7

Herstellung von (Ib) für P = Rinderserumalbumin (BSA), $R_1, R_2 = \text{CH}_3$, $R_1 = 1\beta\text{-D-Glucopyranosyl}$, $R_C = \text{Rhodamin B}$, $n = 6.8\text{-}12.5$.

[0043] Analog Beispiel 1 werden in 0.1-molarem Phosphatpuffer, pH 7.0 (2932,8 μl), Rinderserumalbumin (1 mg, 0.015 μmol), 5-%ige Acetonlösung in Wasser (67.2 μl , 45 μmol), Rhodamin B (400 μg , 0.835 μmol , in 400 μl Wasser) und $\beta\text{-D-Glucopyranosylisocyanat}$ (1.9 mg, 10 μmol , in 1 ml Wasser) umgesetzt. Das $\beta\text{-D-Glucopyranosylisocyanat}$ wird frisch aus 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl- $\beta\text{-D-glucopyranosylisocyanat}$ (3.6 mg, 10 μmol) durch Lösen in 5 ml Methanol, 5 h Rühren bei RT mit einer katalytischen Menge NaOMe, Neutralisieren mit Dowex H^+ Ionentauscher, Filtrieren und Konzentrieren des Filtrats hergestellt. Die Bestimmung der Konjugatausbeute und der mittleren Epitopdichte erfolgt photometrisch durch Messung der Extinktionen bei 280 nm (Rinderserumalbumin) und 575 nm (Rhodamin B).

Ergebnis nach 2 Tagen Reaktionszeit:	
Rinderserumalbumin: 15 nmol Konjugatausbeute: 100%	Rhodamin B: 6,8 nmol mittlere Epitopdichte: $n=0.45$
Ergebnis nach 4 Tagen Reaktionszeit:	
Rinderserumalbumin: 12 nmol Konjugatausbeute: 80%	Rhodamin B: 12,5 nmol mittlere Epitopdichte: $n=1.04$




Beispiel 8

Herstellung von (Ib) für P = Meerrettichperoxidase (HRP), $R_1 = \text{H}$, $R_2 = \text{CH}_2\text{CH}_3$, $R_1 = \text{Cyclohexyl}$, $R_C = 5\text{-(Biotinoylamino)pentyl}$, $n = 3.0$

[0044] Analog Beispiel 1 werden in 0.1-molarem Phosphatpuffer, pH 7.5 (4000 μl), Meerrettichperoxidase (1.9 mg, 0.049 μmol HRP), (+)-Biotinaminocaprinsäure (14.5 mg, 45 μmol), Propionaldehyd (2.4 μg , 0.05 μmol) und Cyclohexylisocyanat (2 Tropfen) umgesetzt. Die Bestimmung der Konjugatausbeute erfolgt photometrisch durch Messung der Extinktion bei 280 nm. Die Restaktivität des Peroxidasekonjugats erfolgt photometrisch im Vergleich zu nativer Peroxidase durch Oxidation einer ABTS-Farbstofflösung und Messung der Extinktion bei 404 nm. Die quantitative Bestimmung des Biotinylierungsgrads erfolgt photometrisch durch Verdrängung von HRP-BA aus seinem Avidinkomplex und Messung der Extinktion bei 500 nm sowie qualitativ durch ELISA-Test an Streptavidin-belegten Mikrotiterplatten.

Ergebnis nach 1 Tag Reaktionszeit:	
Peroxidasekonjugat: 36 nmol (75%) Biotingehalt: 108 nmol	Restaktivität: 62% Epitopdichte: $n=3.0$




Beispiel 9

Herstellung von (Ic) für P = ox-Meerrettichperoxidase (ox-HRP), R_1 = Cyclohexyl, R_C = Rhodamin B, R_A = 5-(Biotinoylamino)pentyl, $n = 3.3-3.4$

[0045] Analog Beispiel 1 werden in 0.1-molarem Phosphatpuffer, pH 7.5 (4000 μ l), NaIO_4 -oxidierte Meerrettichperoxidase (1.8 mg, 0.045 μ mol), (+)-Biotinamidopentylamin (14.8 mg, 45 μ mol), Rhodamin B (21.6 mg, 45 μ mol) und Cyclohexylisocyanid (2 Tropfen) umgesetzt. Die Bestimmung der Konjugatausbeute erfolgt photometrisch durch Messung der Extinktion bei 280 nm (Peroxidasekonjugat) und 575 nm (Rhodamin B). Die Bestimmung der Restaktivität des Peroxidasekonjugats erfolgt photometrisch im Vergleich zu nativer Peroxidase durch Oxidation von ABTS-Lösung und Messung der Extinktion bei 404 nm. Die quantitative Bestimmung des Biotinylierungsgrads erfolgt photometrisch durch Verdrängung von ox-HRP-BA aus seinem Avidinkomplex und Messung der Extinktion bei 500 nm, sowie qualitativ durch einen ELISA-Test an Streptavidin-belegten Mikrotiterplatten.

Ergebnis nach 1 Tag Reaktionszeit:	
Molekulargewicht: 46118 Da	Epitopendichte: $n = 3.4$
Peroxidasekonjugat: 4.8 nmol (11%)	Restaktivität: 93%
Rhodamin B-Gehalt: 16.8 nmol	Epitopendichte: $n=3.5$
Biotingehalt: 16 nmol	Epitopendichte: $n=3.3$




Beispiel 10

Herstellung von (Ic) für P = ox-Meerrettichperoxidase (ox-HRP), R₁ = Cyclohexyl, R_C = 5-(Biotinoylamino)pentyl, R_A = 5-(Biotinoylamino)pentyl, n = 1.0

[0046] Analog Beispiel 1 werden in 0.1-molarem Phosphatpuffer, pH 7,5 (4000 µl), NaIO₄-oxidierte Meerrettichperoxidase (1 mg, 0.026 µmol), (+)-Biotinamidopentylamin (14.8 mg, 45 µmol), (+)-Biotinaminocaprinsäure (14.5 mg, 45 µmol) und Cyclohexylisocyanid (2 Tropfen) umgesetzt. Die Bestimmung der Konjugatausbeute erfolgt photometrisch durch Messung der Extinktion bei 280 nm. Die Messung der Restaktivität des Peroxidasekonjugats erfolgt photometrisch im Vergleich zu nativer Peroxidase durch Oxidation von ABTS-Lösung und Messung der Extinktion bei 404 nm. Die quantitative Bestimmung des Biotinylierungsgrads erfolgt photometrisch durch Verdrängung von ox-HRP-BA aus seinem Avidinkomplex und Messung der Extinktion bei 500 nm sowie qualitativ durch ELISA-Test an Streptavidin-belegten Mikrotiterplatten.

Ergebnis nach 1 Tag Reaktionszeit:	
Peroxidasekonjugat: 16 nmol (67%)	Restaktivität: 157%
Biotingehalt: 16 nmol	Epitopdichte: n=1.0




Beispiel 11

[0047] Proteomanalyse: Die löslichen Proteine eines Mikroorganismus, z.B. aus den Zellen einer Hefe oder eines *E.coli* Bakteriums, oder eines Säugerorganismus, z.B. aus dem Blutserum eines Menschen, werden nach den geläufigen Verfahren gewonnen (Zellaufschluß, Extraktion, Waschen in Puffern etc.). Anstelle einer direkten Auftragung auf ein Elektrophorese-Gel wird vorher die Derivatisierung der Proteinmischung in wäßrigem Puffer - in ganz analoger Weise wie in einem der vorstehenden Beispiele beschrieben - durchgeführt. Nach zweidimensionaler Auftrennung wird das Gel wie üblich z.B. mit Cromassie Blue, mit Silbernitrat oder mit einem Fluoreszenz-Farbstoff entwickelt. War zumindest eine der drei eingesetzten niedermolekularen Reaktionskomponenten bereits ein Derivat eines geeigneten Fluoreszenzfarbstoffes, so lassen sich die entsprechend modifizierten Proteine direkt mit einem Lesegerät nachweisen. Das Image-Prozessing (z.B. mittels Programm Melanie II, PC-NT der Firma Biorad) und das sich anschließende Rechner-gestützte Prozessing (d.h. die Mustererkennung und -auswertung) werden wie bei der Auswertung zweidimensionalen Elektrophorese-Chromatogramme üblich vorgenommen. Zusätzlich können die interessierenden Gel-Spots wie üblich mit einem Gel-Picker aufgenommen werden und nach Trypsin-Verdauung der massenspektrometrischen Analyse zugeführt werden (MALDI-TOF, ESI, MS-MS).

Patentansprüche

1. Proteinkonjugate der in den Formeln (Ia-c) angegebenen Struktur,



wobei **P** ein freie Amino-, Carboxyl- oder Aldehydgruppen tragendes Protein wie ein Albumin, Immunglobulin, Antikörper, Avidin, Streptavidin, Hemocyanin, Lectin, Enzym oder Serum-Glycoprotein bedeutet,

und R_A für einen von Aminen $R_A\text{-NH}_2$ abgeleiteten Rest steht, wobei R_A ein Aminogruppen tragender linearer oder verzweigter Alkyl- oder Cycloalkylrest aus bis zu 18 C-Atomen, ein Aminogruppen tragendes Alkaloid, Peptid oder Protein, Kohlenhydrat, Nucleotid, Nucleosid, Steroid, Terpen, Porphyrin, Chlorin, Corrin, Eicosanoid, Pheromon, Vitamin, insbesondere ein n-(Biotinamido)-n-alkylrest mit $n = 2-8$, ein Antibiotikum, Cytostatikum, ein Farbstoffmolekül oder einen Kryptanden, bedeuten,

und R_C für einen von Carbonsäuren $R_C\text{-CO}_2\text{H}$ abgeleiteten Rest steht, wobei R_C ein Carboxylgruppen tragender linearer oder verzweigter Alkyl- oder Cycloalkylrest aus bis zu 18 C-Atomen, ein Carboxylgruppen tragendes Alkaloid, Peptid oder Protein, Kohlenhydrat, Nucleotid, Nucleosid, Steroid, Terpen, Porphyrin, Chlorin, Corrin, Eicosanoid, Pheromon, Vitamin, insbesondere Biotin, ein Antibiotikum, Cytostatikum, ein Farbstoffmolekül oder einen Kryptanden bedeuten,

und R_I für einen von Isonitrilen $R_I\text{-NC}$ abgeleiteten Rest steht, wobei R_I ein Isonitrilgruppen tragender linearer oder verzweigter Alkyl- oder Cycloalkylrest aus bis zu 18 C-Atomen, Methoxycarbonylethyl, t-Butoxycarbonylmethyl, Phenyl, o-Alkylphenyl, m-Alkylphenyl, p-Alkylphenyl, o-Halogenphenyl, m-Halogenphenyl, p-Halogenphenyl, 2,3-Dihalogenphenyl, 2,4-Dihalogenphenyl, 3,4-Dihalogenphenyl, o-Alkoxyphenyl, m-Alkoxyphenyl, p-Alkoxyphenyl, o-Arylphenyl, m-Arylphenyl, p-Arylphenyl, o-Aryloxyphenyl, m-Aryloxyphenyl, p-Aryloxyphenyl, o-Nitrophenyl, m-Nitrophenyl, p-Nitrophenyl, 1-Naphthyl, 2-Naphthyl, Benzolsulfonylmethyl, p-Toluolsulfonylmethyl, ein Pyranosyl-, Furanosyl- oder Nucleosyl-Rest, einen n-(Biotinamido)-n-alkylrest mit $n = 2-8$ oder ein Farbstoffmolekül bedeuten,

und R_1 und R_2 für einen von Carbonylverbindungen abgeleiteten Rest $R_1\text{-C(=O)-R}_2$ stehen und gleichzeitig oder unabhängig voneinander Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl, Cyclopropyl, Butyl, i-Butyl, t-Butyl, Cyclobutyl, Pentyl, Cyclopentyl, Hexyl, Cyclohexyl, 2-Methylbutyl, Heptyl, Octyl, Nonyl, Decyl, Undecyl, Dodecyl, Methoxycarbonylethyl, t-Butoxycarbonylmethyl, Phenyl, o-Alkylphenyl, m-Alkylphenyl, p-Alkylphenyl, o-Halogenphenyl, m-Halogenphenyl, p-Halogenphenyl, 2,3-Dihalogenphenyl, 2,4-Dihalogenphenyl, 3,4-Dihalogenphenyl, o-Alkoxyphenyl, m-Alkoxyphenyl, p-Alkoxyphenyl, o-Arylphenyl, m-Arylphenyl, p-Arylphenyl, o-Aryloxyphenyl, m-Aryloxyphenyl, p-Aryloxyphenyl, o-Nitrophenyl, m-Nitrophenyl, p-Nitrophenyl, 1-Naphthyl, 2-Naphthyl, Oxiranyl, Vinyl, Propenyl, Propen-2-yl, 2-Penten-2-yl, 3-Hepten-3-yl, Penta-1,3-dienyl, Phenylmethyl, 1-Phenylethyl, 2-Phenylethyl, Cyclohexen-3-yl, Cyclohexen-4-yl, 2-Furyl, 3-Furyl, 2-Thienyl, 3-Thienyl, 2-Pyrrolyl, 3-Pyrrolyl, Halogenmethyl, Dihalogenmethyl, Trihalogenmethyl, 2-Pyridyl, 3-Pyridyl, 4-Pyridyl bedeuten können


und $n = 1-15$ bedeutet.

2. Verfahren zur Herstellung der Proteinkonjugate nach Anspruch 1, indem man ein lösliches Protein (**P**) oder ein an einer festen Phase immobilisiertes Protein (**P**), das freie Amino-, Carbonsäure- oder Aldehyd-Gruppen trägt, mit einem Amin $R_A\text{-NH}_2$ oder einer Carbonsäuren $R_C\text{-CO}_2\text{H}$, einem Isonitril $R_I\text{-NC}$ und einer Carbonylverbindung $R_1\text{-C(=O)-R}_2$, wobei die Reste R_A , R_C , R_I , R_1 und R_2 die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben, in wässriger Lösung zu den betreffenden Protein-Konjugaten (Ia), (Ib) oder (Ic) umsetzt, wobei die jeweiligen Produkte (Ia) aus einem Protein (**P**), einem Amin $R_A\text{-NH}_2$, einem Isonitril $R_I\text{-NC}$ und einer Carbonylverbindung $R_1\text{-C(=O)-R}_2$, die Produkte (Ib) aus dem Protein (**P**), einer Carbonsäure $R_C\text{-CO}_2\text{H}$, einem Isonitril $R_I\text{-NC}$ und einer Carbonylverbin-

ung $R_1-C(=O)-R_2$, und die Produkte (Ic) aus einem oxidierten Protein (P), einer Carbonsäure R_C-CO_2H , einem Amin R_A-NH_2 und einem Isonitril R_I-NC erhalten werden, wobei die Reste R_A , R_C , R_I , R_1 und R_2 die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben.

3. Ein Verfahren gemäß Anspruch 2, beim dem die Umsetzung des Proteins (P) mit dem Amin R_A-NH_2 oder der Carbonsäure R_C-CO_2H , und dem Isonitril R_I-NC und der Carbonylverbindung $R_1-C(=O)-R_2$ erfolgt, indem das Protein (P) in wäßrigem Puffer gelöst oder suspendiert mit dem Amin R_A-NH_2 oder mit der Carbonsäure R_C-CO_2H und dem Isonitril R_I-NC und der Carbonylverbindung $R_1-C(=O)-R_2$ umgesetzt, wobei jeweils ein 10-10.000 facher molarer Überschuß zum Protein (P) eingesetzt wird.
4. Ein Verfahren gemäß Ansprüchen 2-3, bei dem die Umsetzung in wäßrigen Pufferlösungen, insbesondere in 0.001-1.0 molaren Lösungen aus Natrium- oder Kalium-dihydrogenphosphat mit Dinatrium- oder Dikalium-hydrogenphosphat, oder in Pufferlösungen aus Tris(hydroxymethyl)-aminomethan mit Salzsäure, im pH-Bereich zwischen 5 und 9 erfolgt.
5. Ein Verfahren gemäß Ansprüchen 2-4, bei dem der Reaktionspuffer weitere Cosolventien wie Methanol, Ethanol, Propanol, i-Propanol, Butanol, Essigsäureethylester, Essigsäuremethylester, Dimethylformamid, Acetonitril, Dimethylsulfoxid oder Sulfolan in Mengen von 0.1-20 Vol-% enthält und die Reaktionstemperaturen zwischen 0° C und 90° C liegen.
6. Die Verwendung der Proteinkonjugate (Ia-c) nach Anspruch 1 in Immunoassays, synthetische Vaccine oder als Biosensoren.
7. Die therapeutische Verwendung der Proteinkonjugate (Ia-c) nach Anspruch 1, in denen mindestens einer der Reste R_C , R_A , R_I , R_1 oder R_2 ein Cytostatikum, gebunden an einen Tumor-spezifischen Antikörper, ein Enzym oder ein Lectin darstellt.
8. Die Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens nach Ansprüchen 2 bis 5 zur Modifizierung von Proteinmischungen in der Probenvorbereitung zur modifizierten Proteomanalyse von Organismen mittels Elektrophorese.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 104 677 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
21.07.2004 Patentblatt 2004/30

(43) Veröffentlichungstag A2:
06.06.2001 Patentblatt 2001/23

(21) Anmeldenummer: 00122132.4

(22) Anmeldetag: 12.10.2000

(51) Int Cl. 7: **C07K 14/00**, C07K 16/00,
C07K 14/435, C07K 14/76,
A61K 47/48, C07K 17/00,
C07K 1/04, C07K 1/02,
A61K 38/43

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 01.12.1999 DE 19957916

(71) Anmelder: **Aventis Research & Technologies
GmbH & Co. KG**
65926 Frankfurt am Main (DE)

(72) Erfinder:
• Kretzschmar, Gerhard, Dr.
65760 Eschborn (DE)
• Ziegler, Thomas, Prof. Dr.
50667 Köln (DE)
• Gerling, Sonja
51063 Köln (DE)
• Lang, Martin
72108 Rottenburg am Neckar (DE)

(74) Vertreter: **Ackermann, Joachim, Dr.**
Postfach 11 13 26
60048 Frankfurt am Main (DE)

(54) **Neue Proteinkonjugate und Verfahren zu deren Herstellung**

(57) Die Erfindung betrifft neue Proteinkonjugate der Formeln (Ia-c). Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung der Proteinkonjugate durch Umsetzung von Proteinen mit drei niedermolekularen Komponenten in einem einzigen Reaktionsschritt, wobei si-

multan bis zu vier Reportergruppen oder Liganden in definierter Stöchiometrie und molekularem Abstand eingeführt werden, sowie Anwendungen der neuen Proteinkonjugate.

EP 1 104 677 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT

der nach Regel 45 des Europäischen Patent-
übereinkommens für das weitere Verfahren als
europäischer Recherchenbericht gilt

Nummer der Anmeldung

EP 00 12 2132

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	VON ZYCHLINSKI H ET AL: "MODEL EXPERIMENTS FOR PEPTIDE FRAGMENT COUPLING WITHOUT RACEMIZATION PRONE ACTIVATED AMINO-ACID DERIVATIVES" ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION IN ENGLISH, Bd. 13, Nr. 7, 1974, Seiten 473-474, XP009019059 ISSN: 0570-0833 * Seite 473, Spalte 2, Absatz 2 - Seite 474, Spalte 1, Absatz 2 *	1,2	C07K14/00 C07K16/00 C07K14/435 C07K14/76 A61K47/48 C07K17/00 C07K1/04 C07K1/02 A61K38/43
X	DE 197 20 165 A (MORPHOCHEM GMBH) 28. Januar 1999 (1999-01-28) * Zusammenfassung; Ansprüche 1-5 * * Seite 10, Zeile 57 - Zeile 59 * --- -/--	1-8	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			C07K A61K
UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE			
<p>Die Recherchenabteilung ist der Auffassung, daß ein oder mehrere Ansprüche, den Vorschriften des EPU in einem solchen Umfang nicht entspricht bzw. entsprechen, daß sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik für diese Ansprüche nicht, bzw. nur teilweise, möglich sind.</p> <p>Vollständig recherchierte Patentansprüche:</p> <p>Unvollständig recherchierte Patentansprüche:</p> <p>Nicht recherchierte Patentansprüche:</p> <p>Grund für die Beschränkung der Recherche:</p> <p>Siehe Ergänzungsblatt C</p>			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 20. Oktober 2003	Prüfer Jenn, T
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN		<p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>D : In der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>	
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</p> <p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p> <p>A : technologischer Hintergrund</p> <p>O : mündliche Offenbarung</p> <p>P : Zwischenliteratur</p>			

EPO FORM 1503 (3.82) (P/4/03)



Europäisches
Patentamt

UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE
ERGÄNZUNGSBLATT C

Nummer der Anmeldung

EP 00 12 2132

Unvollständig recherchierte Ansprüche:

1-8

Grund für die Beschränkung der Recherche:

Die geltenden Patentansprüche 1-8 beziehen sich auf eine unverhältnismäßig große Zahl möglicher Produkte/Verwendungen/Verfahren. In der Tat umfassen sie so viele Wahlmöglichkeiten, Veränderliche, und/oder mögliche Permutationen, dass sie im Sinne von Art. 84 EPÜ in einem solche Maße unklar oder zu weitläufig gefasst erscheinen, als daß sie eine sinnvolle Recherche ermöglichen. Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, die als klar und knapp gefaßt gelten können, nämlich die Produkte/Verwendungen/Verfahren die in den Ausführungsbeispielen angegeben sind, einschliesslich nahverwandter homologer Verbindungen.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER
TEILRECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 12 2132

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	
A	<p>WAKI ET AL: "Peptide synthesis using the four-component condensation (Ugi reaction)" JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON, DC, US, Bd. 99, Nr. 18, 1977, Seiten 6075-6082, XP002165353 ISSN: 0002-7863 * Zusammenfassung * * Seite 6076, Spalte 1; Abbildungen I,II * * Seite 6077, Spalte 2; Abbildungen V,VI *</p>	1,2,5	
A	<p>UGI I: "FROM ISOCYANIDES VIA FOUR-COMPONENT CONDENSATIONS TO ANTIBIOTIC SYNTHESSES" ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL EDITION, VERLAG CHEMIE. WEINHEIM, DE, Bd. 21, Nr. 11, 1982, Seiten 810-819, XP001153409 ISSN: 0570-0833 * Zusammenfassung * * Seite 812, Spalte 2; Beispiele 21-26 * * Seite 816 - Seite 817, Absatz 9 *</p>	1,2	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)

EPO FORM 1503 03.82 (PdC12)



Europäisches
Patentamt

Nummer der Anmeldung

EP 00 12 2132

GEBÜHRENPFLICHTIGE PATENTANSPRÜCHE

Die vorliegende europäische Patentanmeldung enthielt bei ihrer Einreichung mehr als zehn Patentansprüche.

- ☐ Nur ein Teil der Anspruchsgebühren wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die ersten zehn sowie für jene Patentansprüche erstellt, für die Anspruchsgebühren entrichtet wurden, nämlich Patentansprüche:
- ☐ Keine der Anspruchsgebühren wurde innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die ersten zehn Patentansprüche erstellt.

MANGELNDE EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG

Nach Auffassung der Recherchenabteilung entspricht die vorliegende europäische Patentanmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung und enthält mehrere Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen, nämlich:

Siehe Ergänzungsblatt B

- ☐ Alle weiteren Recherchegebühren wurden innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.
- ☐ Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Recherchenabteilung nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
- ☐ Nur ein Teil der weiteren Recherchegebühren wurde innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf Erfindungen beziehen, für die Recherchegebühren entrichtet worden sind, nämlich Patentansprüche:
- ☒ Keine der weiteren Recherchegebühren wurde innerhalb der gesetzten Frist entrichtet. Der vorliegende europäische Recherchenbericht wurde für die Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf die zuerst in den Patentansprüchen erwähnte Erfindung beziehen, nämlich Patentansprüche:

1-8 (zum teil)



Europäisches
Patentamt

**MANGELNDE EINHEITLICHKEIT
DER ERFINDUNG
ERGÄNZUNGSBLATT B**

Nummer der Anmeldung

EP 00 12 2132

Nach Auffassung der Recherchenabteilung entspricht die vorliegende europäische Patentanmeldung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung und enthält mehrere Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen, nämlich:

1. Ansprüche: 1-8 (zum teil)

Proteinkonjugate der Formel (Ia);
Verfahren zur Herstellung der Proteinkonjugate der Formel (Ia);
Verwendung der Proteinkonjugate (Ia) in Immunoassays, synthetische Vaccine oder als Biosensoren;
Therapeutische Verwendung der Proteinkonjugate (Ia);
Verwendung des Verfahrens zur Herstellung von (Ia) zur Modifizierung von Proteinmischungen in der Probenvorbereitung zur modifizierten Proteomanalyse von Organismen mittels Elektrophorese.

2. Ansprüche: 1-8 (zum teil)

Proteinkonjugate der Formel (Ib);
Verfahren zur Herstellung der Proteinkonjugate der Formel (Ib);
Verwendung der Proteinkonjugate (Ib) in Immunoassays, synthetische Vaccine oder als Biosensoren;
Therapeutische Verwendung der Proteinkonjugate (Ib);
Verwendung des Verfahrens zur Herstellung von (Ib) zur Modifizierung von Proteinmischungen in der Probenvorbereitung zur modifizierten Proteomanalyse von Organismen mittels Elektrophorese.

3. Ansprüche: 1-8 (zum teil)

Proteinkonjugate der Formel (Ic);
Verfahren zur Herstellung der Proteinkonjugate der Formel (Ic);
Verwendung der Proteinkonjugate (Ic) in Immunoassays, synthetische Vaccine oder als Biosensoren;
Therapeutische Verwendung der Proteinkonjugate (Ic);
Verwendung des Verfahrens zur Herstellung von (Ic) zur Modifizierung von Proteinmischungen in der Probenvorbereitung zur modifizierten Proteomanalyse von Organismen mittels Elektrophorese.

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 12 2132

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

20-10-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19720165 A	28-01-1999	DE 19720165 A1	28-01-1999
		AU 750974 B2	01-08-2002
		AU 8017598 A	08-12-1998
		CA 2290614 A1	19-11-1998
		DE 59810914 D1	08-04-2004
		WO 9851697 A2	19-11-1998
		EP 0983290 A1	08-03-2000
		HU 0002730 A2	28-12-2000
		JP 2002500643 T	08-01-2002
		NO 995551 A	12-01-2000
		US 6355726 B1	12-03-2002

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)